

Kritériá pre stav lesného porastu po výchove prečistkou a prebierkou do 50 rokov jeho veku

Kvalita vykonania zásahu	Včasnosť zásahu	Drevinové zloženie	Kvalita a poškodenie lesných drevín
Zápoj ¹⁾ lesného porastu je dokonalý až uvoľnený. ²⁾	Prečistka: 1. V prevažne ihličnatých lesných porastoch (zastúpenie ihličnanov nad 60 %) dĺžka korún ihličnanov dosahuje najmenej 60 % výšky. 2. V zmiešaných listnatých a borovicových lesných porastoch výška porastu nepresahuje 5 m. 3. Prebierka: Stredná hrúbka porastu po zásahu nepresahuje 19 cm.	1. Hlavné lesné dreviny³⁾ spolu tvoria najmenej 70 % lesného porastu. 2. Zastúpenie spevňujúcich a melioračných drevín⁴⁾ spolu v HSLT, kde je to relevantné, je najmenej 20 %. 3. Zastúpenie sprievodných drevín⁵⁾ po prečistke je najviac 20 %, po prebierke 10 %.	1. Rozrastlíky, predrastlíky a výrazne deformované jedince sa vyskytujú najviac na 10 % plochy lesného porastu. 2. Výrazné poškodenie kmeňa (nad 30 % obvodu) alebo koruny (nad 50 % objemu) má najviac 30 % jedincov. 3. Výrazne poškodené jedince nevytvárajú súvislé plochy väčšie ako 0,02 ha.

Vysvetlivky:

¹⁾ Zápojom sa vyjadruje vzájomné pretínanie korún vo vodorovnom smere (horizontálny zápoj) alebo v smere zvislom (vertikálny zápoj). Rozoznávame zápoj prehustený, uvoľnený, medzernatý a prerušený. Je podstatným znakom hodnotenia pestovateľského stavu porastov, ktorý ovplyvňuje energetický, svetelný a látkový režim lesného porastu a celého ekosystému.

²⁾ Pri dokonalom zápoji sa koruny dotýkajú, ale neobmedzujú; pri uvoľnenom zápoji sa koruny nedotýkajú, ale do medzier sa nezmestia ďalšie stromy.

³⁾ Hlavnými lesnými drevinami sú lesné dreviny cieľového zastúpenia pre HSLT podľa prílohy č. 3.

⁴⁾ Spevňujúce a melioračné lesné dreviny pre HSLT sú uvedené v prílohe č. 3.

⁵⁾ Sprievodné dreviny sú prípravné lesné dreviny a kry v procese výchovy postupne odstraňované z lesného porastu.